

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 14-1-92014032 (R)

STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE  
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE  
ET DE LA FORÊT  
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA  
LUCCIANA - 20290 - BORGIO -

☎ 95.36.05.70



\*\* PACE ET SALUTE A TUTTI \*\*

## EDITION CORSE

Bulletin Technique N° 1  
du 9 Janvier 1992

### VIGNE

Les conditions météorologiques de l'année écoulée ont été bien différentes des années précédentes sur le plan des précipitations et de leur répartition.

Le mois de janvier a été pluvieux surtout en Haute Corse ainsi que les mois d'avril et mai puis en septembre ; octobre domine et novembre n'a pas été en reste.

En Corse du sud c'est un peu moins important quoique dans certaines vallées comme à Tizzano le déficit est plus sensible.

Alors que le débourrement s'était manifesté normalement, des gelées d'avril ont provoqué quelques dégâts et notamment à Ponte Leccia où 75% des organes fructifères ont été détruits. Sur le plan phytosanitaire les maladies ont été virulentes ; oïdium précoce et résistant, mildiou et botrytis ont provoqué des inquiétudes notamment lorsque les terrains détremés empêchaient toute pénétration des pulvérisateurs.

Les ravageurs n'ont pas montré l'agressivité des années précédentes sauf dans quelques vignobles particuliers. On observe des pointes d'attaques d'acariens vers le 14 juillet et le 15 août ; les vols de tordeuses ont été importants certes, mais les dégâts moins sensibles que prévus, et ce même en troisième génération.

Les cochenilles pernicieuses dans les zones traditionnelles d'Aléria, Abbazia.

La Flavescence dorée demeure plus stable en Haute Corse qu'en Corse du Sud.

Les maladies du bois sont toujours présentes avec une recrudescence pour l'Excoriose dans les vignobles du littoral.

L'Esca poursuit ses dégâts, l'Eutypiose semble localisée dans les vignobles âgés.

Ces maladies ayant été décrites dans le dernier bulletin de 1991, il convient de s'en préoccuper sérieusement dès à présent.

40 Jo 43 422

1992 = N° 1.16

P.50

## MALADIES DU BOIS

### ESCA

Enlever les ceps morts, les brûler autant que possible.

Mastiquer les plaies aussitôt après la coupe.

Traiter 10 jours après la taille et trois semaines avant débourrement avec des spécialités commerciales à base d'arsenite de sodium, à raison de 1250 g/hl de M.A.

- PYRALESCA (Phodiagri Littoral)
- PYRALUMNOL (Procida)
- PYRAL REP (Marty Parazols)

Ces produits sont dangereux mais efficaces

### EXCORIOSE

Les traitements Esca sont efficaces contre cette maladie pour laquelle la dose de 625 g/hl d'arsenite de sodium suffit.

Utiliser des panneaux récupérateurs. Il est regrettable que cette pratique ne soit pas courante dans notre région pour une meilleure utilisation des traitements d'hiver de plus en plus négligés au profit des traitements de post débourrement.

### EUTYPIOSE

La note nationale parue dans le bulletin 209 précise les moyens de lutte dirigés contre cette maladie.

Rappelons qu'un seul produit formulé près à l'emploi serait assez efficace. L'ATEMICEP appliqué au pinceau.

Dans le cas de l'utilisation du sécateur Cisar; veiller au bon usage des cartouches. Ne substituer pas de Benlate ou de l'eau de javel comme cela s'est produit.

Le traitement doit être réalisé en dehors des pleurs.

Eviter le contact avec les bourgeons à cause des risques de phytotoxicité.

Ne pas utiliser le produit en pulvérisateur pour les mêmes raisons.

La technique du recépage est intéressante dans les vignes âgées sur lesquelles on a déjà repéré les symptômes l'année précédente.

Elle consiste à sélectionner un gourmand le plus bas possible pour le substituer au tronc dépérissant qu'il faudra supprimer.

(Voir croquis)

En hiver ou avant le débourrement

